

Indikation: Gastroenterologie, Entzündliche Erkrankungen

Studienname und Titel	Kurzbeschreibung für Patienten	Studienarzt & Studienkoordination	Start am Zentrum
TOASST Studie: Cortisolbehandlung ausschleichen o- der direkt stoppen?	Die Studie soll die Hypothese prüfen, dass auch nach längerer Behandlungsdauer mit Prednison®, Spiricort® oder einem verwandten Produkt auf ein langsames Ausschleichen der Dosis verzichtet werden darf, ohne dass dadurch ein schlechterer Verlauf resultiert. So könnten eine unnötige Verlängerung der Behandlung und all-fällige unerwünschte Nebeneffekte vermieden werden.	PD. Dr. med. Kistler Andreas Email: andreas.kistler@stgag.ch B. Luther Email: birgit.luther@stgag.ch Prof. Dr. Robert Thurnheer Email: robert.thurnheer@stgag.ch S. Bucher Email: susanne.bucher@stgag.ch	KSF 2021 KSM 2021
LUNAR: Langzeitanwendung von Guselkumab: Nicht-interventionelle Bewertung der Ergebnisse aus der klinischen Praxis	Ziel dieser prospektiven Studie ist es, die Therapietreue bei Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu untersuchen, die nach der Zulassung von Guselkumab für diese Indikationen im klinischen Versorgungsalltag damit behandelt werden.	PD Dr. med. Ch. Manser Email: christine.manser@stgag.ch	KSF/KSM 2026

Studienergebnisse

Studienergebnisse beendeter Studien können auf www.clinicaltrials.gov oder <https://www.humanforschung-schweiz.ch/de/studiensuche/> nachgelesen werden.