

Indikation: Lungenembolie

Studienname und Titel	Kurzbeschreibung für Patienten	Studienarzt & Studienkoordination	Start am Zentrum
SAFE-SSPE-Studie: Klinische Beobachtung im Vergleich zu Blutverdünnung bei Tiefrisikopatienten mit isolierten subsegmentalen Lungenembolien: eine multizentrische randomisierte Placebo-kontrollierte Studie	Die Studie untersucht die optimale Behandlung bei Erwachsenen mit kleinen Blutgerinnseln in den Lungenarterien, sogenannten isolierten subsegmentalen Lungenembolien. Ob Patienten mit isolierten subsegmentalen Lungenembolien wirklich von der gängigen Behandlung mit Blutverdünnern profitieren, ist zurzeit unklar. Wir führen diese Studie durch, um die Wirksamkeit und Sicherheit einer Behandlung mit und ohne Blutverdünnung zu vergleichen.	PD. Dr. med. Kistler Andreas Email: andreas.kistler@stgag.ch B. Luther Email: birgit.luther@stgag.ch	KSF 2020

Studienergebnisse

Studienergebnisse beendeter Studien können auf www.clinicaltrials.gov oder <https://www.humanforschung-schweiz.ch/de/studiensuche/> nachgelesen werden.