

4. Untersuchungen des Magen-Darm-Traktes

4.5. Colon (Doppel- oder Einfachkontrastuntersuchung)

Darstellung des Dickdarmes mit Röntgenstrahlen und Kontrastmittel

Dauer

- Ca. 1 - 1 1/2 Stunde

Vorbereitung

- Nur flüssige Kost am Vortag
- Abführen morgens und mittags (außer in Notfällen) mit
 - Vannerlösung (90ml) für Patienten ohne schwere Herzkrankheit oder Nierenversagen
 - 2Btl. Cololyt für Patienten mit schwerer Herzkrankheit oder Nierenversagen
- Am Abend Einlauf mit Klyx Magnum
 - Am Untersuchungstag nichts essen, 1 Tasse Tee oder Mineralwasser ohne Kohlensäure sind erlaubt
- **Achtung:** in der Nacht vor der Untersuchung Infusion abstellen oder nur ganz langsam laufen lassen

Patienteninformationsblatt

- Ja

Einverständniserklärung Patient/in

- Mündlich

Ablauf

- Der Patient liegt auf einem Röntgentisch. Durch das Rectum **wird** Kontrastmittel und später eventuell Luft eingeführt. Die Darmtätigkeit wird vorübergehend durch ein Medikament (Buscopan oder **Glucagon**) intravenös beruhigt
- Anschliessend werden mehrere Röntgenaufnahmen angefertigt und laufend von einem Röntgenarzt beurteilt. Dabei muss sich der Patient mehrmals um die eigene Achse drehen.

Danach

- Viel trinken zur Förderung der Kontrastmittelausscheidung
Stuhldrang kann nach Abklingen der medikamentösen Wirkung relativ rasch auftreten. (Es ist ratsam, nicht zu weit von einer Toilette entfernt zu sein).