

## 4. Untersuchungen des Magen-Darm-Traktes

### 4.3. Dünndarm selektiv nach Sellink

Darstellung des Dünndarmes mit Röntgenstrahlen und Kontrastmittel

#### Dauer

- Ca. 1 - 1 1/2 Stunde, in seltenen Fällen mit Spätaufnahmen

#### Vorbereitung

- Leichte Kost am Vortag
- Abführen mit
  - Vannerlösung (90ml) für Patienten ohne schwere Herzkrankheit oder Nierenversagen
  - 1 Btl. Cololyt für Patienten mit schwerer Herzkrankheit oder Nierenversagen
- Am Untersuchungstag nichts essen. 1 Tasse Tee oder Mineralwasser ohne Kohlensäure sind erlaubt

#### Patienteninformationsblatt

- Ja

#### Einverständniserklärung Patient/in

- Mündlich

#### Ablauf

- Nach Einführen eines Gleitmittels in die Nase legt der Röntgenarzt eine Sonde durch die Nase bis in den Zwölffingerdarm
- Durch diese Sonde wird röntgendichtes Kontrastmittel verabreicht. Die Untersuchung erfolgt auf dem Röntgentisch zunächst in Bauchlage. Gegen das Ende der Untersuchung werden Röntgenaufnahmen durchgeführt, teilweise unter Anwendung einer Kompression (Druck auf den Bauch).

#### Danach

Viel trinken zur Förderung der Kontrastmittelausscheidung